



今回、12人のお子様にご参加いただきました。



① 始めに、みなでお勉強。



② 調剤室へ！処方せんのお薬を揃えましょう。



【錠剤】



【水剤】



【粉薬】



③ 次に薬袋を作りましょう。

④ 薬剤師になりきって、お父さんお母さんにお薬を渡しましょう。



★ おくすりのせつめいしよ ★

お薬名	剤形	用法	注意
アスピリン	錠剤	1日3回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
アセトアミノフェン	錠剤	1日3回、食後、水で飲む。	肝臓病、腎臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
イブuprofen	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。
ロキソニン	錠剤	1日2回、食後、水で飲む。	胃が痛い、嘔吐、下痢、血便、アレルギー反応、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧、心臓病、妊婦、授乳中、高齢者、小児、喫煙者、アルコール摂取者、他の薬との相互作用。



みなさん、お疲れ様でした！！